

| Inhalt | Allgemeinsprachlich | Fachsprache |
|---|--|---|
| Situation | Aufklärungsgespräch über eine geplante Magenspiegelung am nächsten Tag | Präoperative Aufklärung über eine Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) |
| Patientin | Frau Merkel, 58 Jahre alt | |
| Geplanter Eingriff | Magenspiegelung | Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) |
| Indikation | Verdacht auf Magenschleimhautentzündung | Verdacht auf Gastritis |
| Dauer | Untersuchungsdauer ca. 10–15 Minuten | |
| Ablauf der Untersuchung | Örtliche Betäubung des Rachens oder kurze Beruhigung | Lokalanästhesie |
| | Einführung eines flexiblen Schlauchs über den Mund | |
| | Untersuchung von Speiseröhre, Magen und Zwölffingerdarm | Untersuchung von Ösophagus, Magen und Duodenum |
| | Einblasen von Luft zur besseren Sicht | |
| | Entnahme von Gewebeproben bei Bedarf | Biopsieentnahme bei Bedarf |
| Vorerkrankungen / Voroperationen | Refluxkrankheit Vorhofflimmern | youtube.com/@Fach.Leiter t.me/Fachleiter t.me/Fachleiterinfo fachleiterinfo@gmail.com instagram.com/fachleiterinfo tiktok.com/@fachleiter |
| Dauermedikation | Phenprocoumon (Marcumar) Rennie bei Bedarf | |
| Allgemeine Risiken | Unverträglichkeit von Medikamenten | |
| | Kreislaufprobleme wie Schwindel oder niedriger Blutdruck | Kreislaufreaktionen wie Schwindel oder Hypotonie |
| | Blutungen | |
| | Seltene Infektionen | |
| Spezielle Risiken der ÖGD | Vorübergehende Blähungen durch Luft im Bauch | Meteorismus |
| | Reizung oder Verletzung der Schleimhaut | |
| | Sehr selten Loch in der Wand von Speiseröhre oder Magen | Perforation |
| | Im Ernstfall ist eine Notoperation notwendig | Notfalloperation bei schwerer Perforation erforderlich |

| | | |
|--|--|---|
| Vor der Untersuchung | Mindestens 6 Stunden nichts essen oder trinken | Präoperative Nüchternheit für mindestens 6 Stunden |
| | Klare Flüssigkeiten bis 2 Stunden vorher erlaubt | |
| | Rücksprache bei blutverdünnenden Medikamenten | Rücksprache bei Antikoagulation erforderlich |
| Nach der Untersuchung (allgemein) | Etwa 30 Minuten Überwachung | Postinterventionelle Überwachung für ca. 30 Minuten |
| Nach Sedierung | Am Untersuchungstag nicht Autofahren | Fahrverbot am Untersuchungstag nach Sedierung |
| | Kein Alkohol | Alkoholkarenz |
| | Nicht rauchen | Nikotinkarenz |
| | Keine Maschinen bedienen | |
| | Begleitperson notwendig | |
| | Arbeitsunfähigkeit am Untersuchungstag | |

[youtube.com/@Fach.Leiter](https://www.youtube.com/@Fach.Leiter)
[t.me/Fachleiter](https://www.t.me/Fachleiter)
[t.me/Fachleiterinfo](https://www.t.me/Fachleiterinfo)
fachleiterinfo@gmail.com
[instagram.com/fachleiterinfo](https://www.instagram.com/fachleiterinfo)
[tiktok.com/@fachleiter](https://www.tiktok.com/@fachleiter)

Begrüßung + Plan

Guten Tag, Frau Merkel.

Mein Name ist Dr. ... Ich möchte heute mit Ihnen über die geplante (1) _____ sprechen, die morgen durchgeführt werden soll. Dabei erkläre ich Ihnen den (2) _____ der Untersuchung, mögliche Risiken und worauf Sie vorher und nachher achten müssen. Wenn etwas (3) _____ ist, können Sie jederzeit Fragen stellen.

Bei Ihnen besteht der Verdacht (4) _____ eine Magenschleimhautentzündung. Mit der Magenspiegelung können wir die Speiseröhre, den Magen und den oberen Teil des (5) _____ genau anschauen und mögliche Entzündungen oder andere Veränderungen erkennen.

unklar, Magenspiegelung, Dünndarms, Ablauf, auf

Verlauf

Die Untersuchung dauert normalerweise (6) _____ 10 bis 15 Minuten.

Für die Untersuchung bekommen Sie entweder eine örtliche Betäubung (7) _____ den Rachen oder auf Wunsch ein kurzes Beruhigungsmittel, damit Sie entspannter sind und möglichst wenig von der Untersuchung (8) _____.

Anschließend führen wir einen dünnen, flexiblen Schlauch vorsichtig (9) _____ den Mund ein. Über diesen Schlauch können wir die Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm (10) _____.

© Fachleiter. Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Bearbeitung oder Veränderung ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. [youtube.com/@Fach.Leiter](https://www.youtube.com/@Fach.Leiter)-----[t.me/Fachleiter](https://www.t.me/Fachleiter)

_____. Während der Untersuchung wird etwas Luft (11) _____, damit wir besser sehen können. Dadurch kann es später vorübergehend (12) _____ einem Druckgefühl oder Blähungen im Bauch kommen. Das ist normalerweise harmlos und verschwindet wieder von (13) _____.

Falls nötig, können wir kleine Gewebeproben (14) _____. Das nennt man Biopsie. Die Entnahme ist normalerweise nicht (15) _____.

selbst, schmerzhaft, ungefähr, zu, untersuchen, mitbekommen, entnehmen, eingeblasen, über, für

Komplikationen

Sie haben als Vorerkrankungen eine Refluxkrankheit und Vorhofflimmern. Außerdem nehmen Sie Marcumar (16) _____. Da Marcumar das Blut verdünnt, müssen wir vorher genau (17) _____, ob und wann das Medikament pausiert werden soll. Das entscheiden wir gemeinsam mit den behandelnden Ärzten, damit das Risiko (18) _____ Blutungen möglichst gering bleibt.

Wie bei jeder Untersuchung gibt es auch hier allgemeine Risiken und mögliche (19) _____. Manche Menschen vertragen die Medikamente oder das Beruhigungsmittel nicht gut. Außerdem kann es zu Kreislaufproblemen wie Schwindel oder niedrigem Blutdruck (20) _____. Blutungen oder Infektionen sind selten, aber grundsätzlich möglich.

Spezielle Risiken der Magenspiegelung sind Reizungen oder kleine Verletzungen der (21) _____. Sehr selten kann es zu einem Loch in der Wand der Speiseröhre oder des Magens kommen. In so einem Fall wäre möglicherweise eine Notoperation (22) _____. Insgesamt ist das Risiko aber sehr gering.

notwendig, besprechen, Schleimhaut, ein, kommen, Nebenwirkungen, für

Berücksichtigungen

Wichtig ist, dass Sie vor der Untersuchung nüchtern (23) _____. Das bedeutet: mindestens sechs Stunden vorher nichts essen und nichts trinken. Klare Flüssigkeiten wie Wasser dürfen Sie meistens bis zwei Stunden vorher (24) _____.

Nach der Untersuchung bleiben Sie noch ungefähr 30 Minuten bei uns zur (25) _____.

Falls Sie ein Beruhigungsmittel bekommen, dürfen Sie am selben Tag nicht selbst Auto fahren, keine Maschinen bedienen und keinen Alkohol trinken. Auch Rauchen sollten Sie (26) _____. Außerdem brauchen Sie eine Begleitperson, die Sie nach Hause (27) _____. Am Untersuchungstag sollten Sie außerdem nicht arbeiten.

Haben Sie im Moment noch Fragen oder gibt es etwas, das ich noch genauer (28) _____ soll?

erklären, vermeiden, trinken, bringt, Überwachung, bleiben

Antworten

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. Magenspiegelung | 6. ungefähr | 16. ein | 23. bleiben |
| 2. Ablauf | 7. für | 17. besprechen | 24. trinken |
| 3. unklar | 8. mitbekommen | 18. für | 25. Überwachung |
| 4. auf | 9. über | 19. Nebenwirkungen | 26. vermeiden |
| 5. Dünndarms | 10. untersuchen | 20. kommen | 27. bringt |
| | 11. eingeblasen | 21. Schleimhaut | 28. erklären |
| | 12. zu | 22. notwendig | |
| | 13. selbst | | |
| | 14. entnehmen | | |
| | 15. schmerzhaft | | |



Fachleiter